



AMINEX 720 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524
www.agrosarag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

2,4 – D En forma de Sal dimetilamina del ácido (2,4-diclorfenoxi) acético (IUPAC) 720 g/L

Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2460

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

INSTRUCCIONES DE USO

AMINEX® 720 SL, es un herbicida hormonal post emergente selectivo, para el control de malezas de hojas anchas en los cultivos de maíz, caña de azúcar y potreros. Su efecto generalmente comienza a evidenciarse a los 3-4 días después de la aplicación.

Para que el producto desarrolle su óptima actividad herbicida, las malezas deberán encontrarse en un período de crecimiento activo. En malezas leñosas, el mejor momento de la aplicación es el principio de la floración.

Contra malezas rastreras, aplicar antes o durante la floración. Plantas expuestas al sol, responden mejor a la acción del producto.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS L/Ha	PC	PR
MAIZ	VERDOLAGA (<i>Portulaca oleracea</i>) BOTONCILLO (<i>Caperonia palustris</i>) ESCOBA NEGRA (<i>Sida acuta</i>) AMOR SECO (<i>Biden pilosa</i>) BLEDO (<i>Amaranthus dubius</i>)	1.5	15 Días	0 Horas
POTREROS	DORMIDERA (<i>Mimosa pudica</i>) CHILINCHIL (<i>Cassia tora</i>) CADILLO (<i>Desmodium tortuosum</i>) VIERNES SANTO (<i>Phyllanthus niruri</i>) PATEGORGOLA (<i>Croton trinatis</i>)	1.0	N/A	
CAÑA DE AZUCAR	BATATILLA (<i>Ipomoea congesta</i>) CHILINCHIL (<i>Cassia tora</i>) BLEDO (<i>Amaranthus dubius</i>) GUALOLA (<i>Polygonum segetum</i>) VERDOLAGA (<i>Portulaca oleracea</i>) ESPALDILLA (<i>Corchorus orinocensis</i>)	1.5	15 Días	
ARROZ	VIERNES SANTO (<i>Phyllanthus niruri</i>) VERDOLAGA (<i>Portulaca oleracea</i>) VERBENA (<i>Verbena litoralis</i>) PEGA PEGA (<i>Desmodium tortuosum</i>) PALO DE AGUA (<i>Jussiaea linifolia</i>) BLEDO (<i>Amaranthus dubius</i>)	1.0	N/A	

PREPARACION DE MEZCLAS

Agregue agua al tanque de preparación hasta $\frac{1}{4}$ o hasta la mitad de su capacidad. Vierta el producto directamente al tanque y mezcle bien mediante agitación mecánica. No es recomendable hacer mezclas con sustancias alcalinas.



AMINEX 720 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA



COMPATIBILIDAD

AMINEX® 720 SL, no es compatible con herbicidas cuya formulación sea emulsionable en agua, pero si puede mezclarse con productos en forma de polvos mojables, gránulos dispersables y solubles en agua.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
CONSERVE EN UN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS

RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II. MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

(Franja de color amarillo)