



# CAVALIER 325 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.

Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 15 24

www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

### INGREDIENTE ACTIVO

**Azoxystrobin** methyl (E)-2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3- (IUPAC) ..... 200 g/L

**Difenoconazole** 3-chloro-4-((2RS,4RS,2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl)phenyl 4-chlorophenyl ether (IUPAC) ..... 125 g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

## REGISTRO NACIONAL ICA No. 2203

### INSTRUCCIONES DE USO

**CAVALIER® 325 SC** es un fungicida preventivo y fuertemente curativo, que mezcla dos ingredientes activos: Azoxystrobin y Difenoconazole.

El Azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial de las células de los hongos, al impedir la transferencia de electrones entre el citocromo b y el c1, evitando la formación de energía (ATP) necesaria para su crecimiento y desarrollo. Difenoconazole inhibe la síntesis de ergosterol, que causa un incremento del lanosterol, lo cual a su vez ocasiona un incremento de la permeabilidad de la membrana, disturbios en el transporte de nutrientes, desequilibrio en la biosíntesis de quitina y en el balance enzimático deteniendo el crecimiento del micelio del hongo

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS cc/Ha	PC	PR
Arroz	<b>Manchado de Grano</b> ( <i>Helminthosporium oryzae</i> )	400	10 Días	12 Horas
Frijol	<b>Antracnosis</b> ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> )	400	14 Días	
Tomate Uchuva Lulo Tomate de Árbol Ají Pimentón Berenjena	<b>Tizón Temprano</b> ( <i>Alternaria solani</i> )	325 – 375	7 Días	

### MOMENTO DE APLICACIÓN

En Arroz, realizar la aplicación cuando se presente en el cultivo un espigamiento no superior al 5%.

En Frijol realizar la aplicación cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad ó cuando las condiciones climáticas sean propicias para el desarrollo de la misma.

En Tomate realizar la aplicación cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad ó cuando las condiciones climáticas sean propicias para el desarrollo de la misma

### COMPATIBILIDAD

**CAVALIER® 325 SC** es compatible con los plaguicidas que usan normalmente, sin embargo se recomienda realizar una mezcla previa a pequeña escala para evaluar posibles incompatibilidades no registradas. No compatible con fungicidas a base de sales de estaño (Brestanid y Duter).

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
CONSERVE EN UN LUGAR CERRADO  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

### RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**CATEGORIA TOXICOLOGICA II  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**