



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.  
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 7451524- 634 8391 - 634 8392  
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

### INGREDIENTE ACTIVO

CYHALOFOP BUTYL .....180 g/L  
Ingredientes Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

## REGISTRO NACIONAL ICA No. 0622

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A

## GENERALIDADES

DESAFIO® EC, es un herbicida post-emergente sistémico, recomendado para el control de malezas gramíneas, de rápida absorción a través del follaje de las plantas. Es traslocado a los tejidos meristematicos de la planta, donde ejerce su acción herbicida.

DESAFIO® EC, es compatible únicamente con los herbicidas pre-emergentes Pendimetalina, Thiazopir y Oxadiazon para el control post-emergente y residual de las malezas en el cultivo del arroz.

## RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO | MALEZAS   | DOSIS    | P.C     | P.R      |
|---------|---|----------|---------|----------|
| ARROZ   | <b>LIENDRE PUERCO</b><br><i>Echinochloa colonum</i><br><b>GUARDAROCIO</b><br><i>Digitaria sanguinalis</i><br><b>CAMINADORA</b><br><i>Rottboellia cochinchinensis</i><br><b>PAJA PELUDA</b><br><i>Paspalum pilosum</i> | 1.5 L/ha | 45 días | 12 horas |

**P.C.: PERIODO DE CARENCIA:** intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha de un producto agrícola. En el caso de aplicaciones pos cosecha se refiere al intervalo entre la última aplicación y el consumo del producto agrícola.

**P.R.: PERIODO DE REENTRADA:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas o animales a las áreas tratadas.

DESAFIO® EC es un herbicida que debe aplicarse en postemergencia al cultivo y a las malezas.

En arroz hasta 15 días después de la emergencia. Malezas gramíneas de hasta 1 hoja, acompañado de postemergentes para sello.

## COMPATIBILIDAD

DESAFIO® EC, es incompatible con herbicidas para el control de hojas anchas y ciperáceas, tales como 2,4D, loxinil, Triclopyr, Bispyribac sodio, Bentazon y Sulfonilureas en general. La mezcla o aplicación cercana de DESAFIO® EC con algunos de estos productos, tiene un efecto antagónico. La aplicación de DESAFIO® EC debe hacerse 7 días antes o 15 días después de la aplicación de estos productos.

## RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a los anotados en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

