



FUNGITANE 80 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.

Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524

www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Mancozeb producto de coordinación del ión de zinc y el Etilenbisditiocarbamato de manganeso, equivalente a..... 800 g/Kg

Aditivos c.s.p. 1 Kilo

REGISTRO DE VENTA ICA No. 4072

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

INSTRUCCIONES DE USO

FUNGITANE® 80 WP es formulado como polvo Mojable con ingrediente activo MANCOZEB, para ser empleada en aspersión en el control de enfermedades fungosas de las plantas. De acuerdo a la clasificación FRAC, el Mancozeb se encuentra ubicado con mecanismo de acción multisitio, lo que disminuye la posible resistencia que pueda tener este ingrediente activo por el uso en los cultivos recomendados.

CULTIVOS	ENFERMEDAD	Dosis (PC/ha)
ARROZ	AÑUBLO, BRUZONE O PUDRICIÓN DEL CUELLO (<i>Pyricularia oryzae</i>) MANCHA LINEAL (<i>Cercospora oryzae</i>) MANCHA CIRCULAR O HELMINTHOSPORIASIS (<i>Colletotrichum spp</i>)	4 kg/ha Usar de 60 a 80 L/ha de mezcla para avioneta y helicóptero respectivamente.
CEBOLLA, AJO Y PUERRO	MILDEO VELLOSO (<i>Peronospora destructor</i>) MANCHA PUPÚREA (<i>Alternaria porri</i>) AÑUBLO DE LA HOJA (<i>Botrytis spp</i>)	500 g/200 L de agua. Agregue 120 cm ³ de un adherente/200 L de mezcla
PAPA	GOTA (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 – 500 g/200 L de agua
PAPA SEMILLA	DESINFECCIÓN	Inmersión instantánea en suspensión que contenga 450 g/100 L de agua.
TOMATE	TIZÓN TARDÍO (<i>Phytophthora infestans</i>)	450 – 600 g/200 L de agua
ROSA	MANCHA NEGRA (<i>Diplocarpon rosae</i>)	Aplique 450 g/200 L de agua cada 7 a 14 días
CRISANTEMO	MOHO GRIS (<i>Botrytis cinerea</i>) TIZÓN (<i>Ascochyta sp</i>) MANCHA FOLIAR (<i>Septoria leucanthemi</i>)	Aplique 450 g/200 L de agua cada 7 a 14 días



FUNGITANE 80 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA



PC: Periodo de Carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación del producto y la cosecha

PR: Periodo de Reentrada. Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso al área tratada por personas o animales.

EPOCA DE APLICACIÓN

FUNGITANE® 80 WP es un fungicida que debe aplicarse En papa y tomate cuando aparezcan los primeros síntomas cada 7 – 10 días. En casos severos 7 días.

RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

