



FUNNOMIL 760 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Cymoxanil (1-(-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea).....	60 g/Kg
Propineb ((2-((dithiocarboxy)amino)-1-methylethyl)carbamodithioato)((2-)-kS,kS')zinc	700 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1 Kilo

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1196

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

INSTRUCCIONES DE USO

FUNNOMIL® 760 WP es un fungicida medianamente tóxico del grupo de los ditiocarbamatos. Mezcla formulada de Fungicida Preventivo (Propineb) & Fungicida Curativo (Cymoxanil), con extraordinarias características Preventivas y Curativas sobre hongos de la clase Oomicetos, especialmente mildes vellosos como *Phytophthora infestans*.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS L/Ha	P.C.	P.R.
PAPA	GOTA <i>Phytophthora infestans</i>	1.5 kg/Ha	7 días	12 horas
TOMATE	TIZON TARDIO <i>Phytophthora infestans</i>			
UCHUVA				
LULO				
TOMATE DE ARBOL				

PC: Periodo de Carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación del producto y la cosecha

PR: Periodo de Reentrada. Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso al área tratada por personas.

EPOCA DE APLICACIÓN

FUNNOMIL® 760 WP, se aplica al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad y repetir 3 a 7 días después.

RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

