



# GAITERO WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.

Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 634 8391 - 634 8392

www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

### INGREDIENTE ACTIVO

Dimethomorph (EZ)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine (IUPAC) ..... 500 g/Kg

Aditivos ..... c.s.p. 1 Kilogramo

## REGISTRO NACIONAL ICA No. 723

### INSTRUCCIONES DE USO

**GAITERO® WP** es un fungicida que actúa específicamente sobre hongos oomicetos, ocasiona la muerte o la lisis de la pared celular del hongo y ofrece una excelente actividad antiesporulante que reduce significativamente el potencial de reinfección del hongo.

Posee propiedades sistémicas locales, con penetración translaminar, y acción curativa temprana con un tiempo prolongado de protección (> 8 días).

### MOMENTO DE APLICACIÓN

**GAITERO® WP** es un fungicida sistémico que debe aplicarse cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.

### COMPATIBILIDAD

**GAITERO® WP**, en caso de desconocerse la compatibilidad con otros plaguicidas, haga una prueba para observar posibles resultados adversos como sedimentación y formación de grumos.

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
CONSERVE EN UN LUGAR CERRADO  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

### RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS Kg/Ha	PC	PR
Tomate	Gota ó tizón Tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )	0.6	16 Días	24 Horas
Papa			7 Días	12 Horas

**CATEGORIA TOXICOLOGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO  
(Banda Color Azul)**