



INIMECTIN 1.8 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.

Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 634 8391 - 634 8392

www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Abamectin extended von Baeyer nomenclature: mixture of $\geq 80\%$ (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14.8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'dihydro-2'H-pyran)-12-yl]-2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl- α -L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl- α -L-arabino-hexopyranoside and $\leq 20\%$ (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14.8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl]-2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl- α -L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl- α -L-arabino-hexopyranoside (IUPAC) 18.83 g/L

Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 0063

INSTRUCCIONES DE USO

INIMECTIN 1.8 EC es un insecticida-acaricida de acción translaminar, eficaz en el control de los estados móviles de los ácaros.

INIMECTIN 1.8 EC actúa por contacto e ingestión ocasionando parálisis de la plaga. De esa manera evita que se alimenten, por lo que mueren entre 3 y 7 días de efectuado el tratamiento

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS L/Ha	PC	PR
ROSA	ACAROS (<i>Tetranychus urticae</i>)	30 a 35 cc /100 litros de agua ó 560 a 1500 cc/Ha	N/A	4 Horas
FRIJOL	MINADOR DE LA HOJA (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	750 cc/Ha	14 días	12 Horas

P.C: Periodo de carencia

P.R: Periodo de reentrada

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Antes de aplicar el producto revise los niveles de la plaga teniendo en cuenta el programa de monitoreo de la misma

COMPATIBILIDAD

Antes de aplicar el producto revise los niveles de la plaga teniendo en cuenta el programa de monitoreo de la misma

INIMECTIN® 1.8 EC no es fitotóxico si se siguen las instrucciones de dosis y uso dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”



CATEGORÍA TOXICOLOGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

