



INITHION® 50 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA



Inithion®

50 EC

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Malathion:..... 500 g/L
diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio)succinate de formulación comercial a 20 °C.
Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2485

INSTRUCCIONES DE USO

INITHION® 50 EC, es un insecticida del grupo químico de los Organofosforados, de amplio espectro con acción por ingestión y contacto. **INITHION® 50 EC**, posee buen poder de penetración en los tejidos vegetales y es muy tolerado por las plantas, pudiéndose por ello, usar en la mayoría de los cultivos incluyendo las plantas ornamentales.

Cultivo	Plaga a controlar	Dosis	PC	PR
Tomate	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2.0 L/Ha	7 días	4 horas
Ornamentales*	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1,2 – 1,4 mL/L de agua dependiendo de presión de la plaga	N.A	
Aguacate	Trips (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> B.)	2.25 – 2.5 L/Ha	7 día	

* Cultivos ornamentales de acuerdo a la Resolución 1418 del 18 de febrero de 2016

“Debido al alto número de especies ornamentales que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objetivo de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada”

MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación de **INITHION® 50 EC** con base en los resultados del monitoreo de la plaga objetivo. **INITHION® 50 EC** debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros insecticidas de diferente mecanismo de acción.

Ornamentales: se recomienda hacer aplicación cuando se observen daños en los primordios florales y también cuando se presente un promedio de 0,5 individuos por planta y/o flor.

Aguacate: la dosis a aplicar depende del nivel de infestación de la plaga. Se recomienda realizar la aplicación cuando se observen daños en los primordios florales y/o también cuando se presente un promedio de por lo menos 0,5 individuos por planta y/o flor.



INITHION® 50 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA



COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**
(Franja de color azul)