



PROPIZOLE 250 EC



FUNGICIDA AGRÍCOLA
REGISTRO DE VENTA 3060

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

PROPIZOLE.....250 g/L

(2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole

Aditivos c.s.p. 1 Kgr

INSTRUCCIONES DE USO

PROPIZOLE® 250 EC, es un fungicida sistémico y residual, de amplio espectro, que aplicado al follaje, tiene efecto protectante y curativo, en especial sobre Sigatoka Negra. Es eficaz en el control de Hongos Ascomicetos, Deuteromicetos y Basidiomicetos en arroz, es Sistémico. La sustancia activa es absorbida rápidamente y traslocada por vía ascendente. Puede ser aplicado en agua, emulsiones de aceite y agua o aceite solamente. Es resistente al lavado por las lluvias y puede aplicarse con intervalos de 14 a 22 días en banano. Actúa sobre los hongos dentro de las plantas inhibiéndoles la síntesis y función de las membranas y paredes celulares. Ello ocurre cuando están formando los haustorios secundarios, deteniéndoles el desarrollo e interfiriendo con la síntesis de los esteroides de las membranas celulares. Por ello, actúa contra razas resistentes a los fungicidas Benzimidazoles, ya que tiene un modo de acción diferente. Los mejores resultados se obtienen cuando se ha iniciado la infección, pero antes de que aparezcan los síntomas.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
ARROZ	<i>Manchado del grano producido por Cuvularia, Helminthosporium, Colletotrichum y Fusarium.</i>	Una aplicación de 600 cc al 100% de floración o una aplicación al inicio de floración y otra a los 7 días.
BANANO	Sigakota negra <i>Mycosphaerella fijensis var. Difformi.</i> Aceite Agrícola a razón de 2 a 12.	Aplicar 400 cc / ha con intervalos entre aplicación de 14 a 22 días. Debe aplicarse en un emulsion con litros / ha.
CAFE	Roya <i>Hemileia vastatrix</i>	0.75 – 1.0 L / ha. Cuando 5 a 20 % de las hojas presentan una ó más pústulas. Las dosis a aplicar depende del grado de infestación y condiciones ambientales. Utilizar PROPIZOLE en periodo de alta presión y alternar con aplicaciones de Fungicidas protectantes. Durante el ciclo de producción realizar hasta 3 aplicaciones.

COMPATIBILIDAD

PROPIZOLE® 250 CE, es compatible con otros fungicidas de uso común. En caso de desconocerse la compatibilidad con otros plaguicidas, haga una prueba para observar posibles resultados adversos como sedimentación y formación de grumos.

RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**