



# SALVAJE EW

## HERBICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.  
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524  
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

#### INGREDIENTE ACTIVO

PICLORAM: ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico..... 80 g/L  
FLUROXYPIR: 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético ácido..... 80 g/l  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

### REGISTRO NACIONAL ICA No.1315

### INSTRUCCIONES DE USO

**SALVAJE EW**, es un herbicida sistémico recomendado para controlar malezas de hoja ancha, herbáceas y leñosas que crecen en los potreros. Aplique **SALVAJE EW** en forma de aspersión mezclado con agua. No se mezcle con aceite o ACPM. Para obtener mejores resultados aplique **SALVAJE EW** cuando las malezas estén creciendo vigorosamente, condiciones que se presentan cuando se ha establecido el periodo de lluvias o cuando existe suficiente humedad en el suelo

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS	P.C	P.R
POTREROS	Mortño blanco ( <i>Clidemia rubra</i> ) Chilinchil ( <i>Cássia tora</i> ); Dormidera ( <i>Mimosa pigra</i> ); Rabo de alacrán ( <i>Heliotropium indicum</i> ) Batatilla ( <i>Ipomoea sp</i> ); Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ); Pega pega ( <i>Desmodium tortuosum</i> ) Escoba dura ( <i>Sida acuta</i> ) Escoba blanca ( <i>Melochia parviflora</i> ) Escoba ( <i>Sida rhombifolia</i> ) Venturosa ( <i>Lantana camara</i> ) Lechosa ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	1,0 L/HA	20 Dias	0 Horas

### MOMENTO DE APLICACIÓN

**SALVAJE EW** es un herbicida sistémico que debe aplicarse cuando las malezas estén creciendo vigorosamente, condiciones que se presentan cuando se ha establecido el periodo de lluvias o cuando existe suficiente humedad en el suelo. Es selectivo a las gramíneas, aplicar en post emergencia de las malezas, dependiendo de las exigencias del cultivo y de las características de las especies a controlar.

“Peligroso para el ganado. Mantener el ganado fuera de las zonas tratadas por lo menos 12 horas después de la última aplicación”.  
“Mantener a los niños o animales fuera de las zonas tratadas por al menos 12 horas después de la última aplicación”.

### COMPATIBILIDAD

**SALVAJE EW**, es compatible con la mayoría de herbicidas de uso corriente. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
CONSERVE EN UN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



# SALVAJE EW

HERBICIDA AGRÍCOLA



## RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**