



# VALTHIONE 3 SL

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROQUIMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.  
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524  
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

### INGREDIENTE ACTIVO

**VALIDAMYCIN:** .....30 g/L  
(1R,2R,3S,4S,6R)-2,3-dihydroxy-6-hydroxymethyl-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethylcyclohex-2-enylamino]cyclohexyl β-D-glucopyranoside de formulación a 20°C

**Aditivos** ..... c.s.p. 1 Lt

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1581

## INSTRUCCIONES DE USO

**VALTHIONE 3 SL** Es un fungicida bactericida de origen biológico con un amplio espectro de control que demostrando una excelente acción curativa y erradicativa de enfermedades causadas por hongos y bacterias.

**VALTHIONE 3 SL** tiene una alta efectividad contra *Rhizoctonia solani* cuando se aplica a plantas con síntomas iniciales; la lesión no se extiende más, detiene su crecimiento evitando la muerte de los tejidos.

CULTIVOS	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C	P.R
Arroz	<b>Rizoctonia</b> ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	1.0 L/ha	14 días	4 horas
Papa	<b>Costra Negra</b> ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	1.0 L/ha	20 días	
Clavel	<b>Mancha anillada</b> ( <i>Cladosporium echinulatum</i> )	1.5 – 2.0 cm <sup>3</sup> /litro de agua	N.A	
Rosa	<b>Mildeo veloso</b> ( <i>Peronospora sparsa</i> )	1.5 – 2.0 cm <sup>3</sup> /litro de agua		
	<b>Mildeo Polvoso</b> ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	1.5 cm <sup>3</sup> /litro de agua		

## MOMENTO DE APLICACIÓN

**VALTHIONE 3 SL**, es un fungicida que debe aplicarse a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

**Clavel:** Aplicar la dosis de 1.5 cm<sup>3</sup>/L de agua de manera preventiva y/o cuando se presenten los primeros síntomas, aplicar la dosis de 2.0 cm<sup>3</sup>/ Litro de agua cuando la enfermedad ya este avanzada.

**Rosa (Mildeo veloso):** Aplicar la dosis de 1.5 cm<sup>3</sup>/L de agua de manera preventiva y/o cuando se presenten los primeros síntomas, aplicar la dosis de 2.0 cm<sup>3</sup>/ Litro de agua cuando la enfermedad ya este avanzada.

**Rosa (Mildeo polvoso):** Aplicar de manera preventiva y/o cuando se presenten los primeros síntomas

## COMPATIBILIDAD

**VALTHIONE 3 SL**, no se debe mezclar sin antes realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.

## RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**