



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Glufosinato de Amonio *Ammonium 4-[hydroxyl (methyl) phoaphinoyl]-DL-homoalaninate* 150 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1499

Titular del Registro:
AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

PRECAUCIONES

ZULU SL, es un herbicida no selectivo para aplicación en post-emergencia a las malezas anuales y perennes cuando tengan de 10 a 15 cm. de altura.

ZULU SL, es un herbicida para aplicación en pre-siembra al cultivo del arroz, se debe aplicar sobre malezas cuando estén en estado de crecimiento activo.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	P.C.	P.R.
* ARROZ	PAPUNGA (<i>Bidens Pilosa</i>)	2.0 L/Ha Aplicación en presiembra al cultivo con malezas entre 10 y 15 cm. Sembrar después de 10 días de la aplicación.	N/A	0 horas
	EMILIA (<i>Emilia Sanchifolia</i>)			
	SUELDA CON SUELDA (<i>Commelina Diffusa</i>)			
	BLEDO (<i>Amaranthus Dubius</i>)			
	PATA DE GALLINA (<i>Eleusine Indica</i>)			
	DIGITARIA (<i>Digitaria Sanguinalis</i>)			
	CAMINADORA (<i>Rottbellia Exaltata</i>)			
	PASTO JOHNSON (<i>Sorghum Halapense</i>)			
	PAJA MONA (<i>Leptochloa Filiformis</i>)			
	BATATILLA (<i>Ipomoea Spp</i>)			
	VERDOLAGA (<i>Portulaca Oleracea</i>)			
	TAMARINDILLO (<i>Phyllanthus Niruri</i>)			
	PALO DE AGUA (<i>Ludwigia Spp</i>)			
	RODILLA DE POLLO (<i>Boheraavia Erecta</i>)			
	CAPERONIA (<i>Caperonia Palustris</i>)			
	DESMODIUM (<i>Desmodium Spp</i>)			
	RABO DE ALACRÁN (<i>Heliotropium Indicum</i>)			
	MASIEGA (<i>Paspalum Virgatum</i>)			
YERBA DE SAPO (<i>Euphorbia Hirta</i>)				
BOTONCILLO (<i>Borreira Lavéis</i>)				
DORMIDERA (<i>Mimosa Pudica</i>)				
CHILINCHIL (<i>Cassia Tora</i>).				



PLATANO Y BANANO	PAJA BERMUDA (<i>Cynodon Dactylon</i>)	1.5 L/Ha Aplicación en postemergencia dirigida a las malezas entre calles del cultivo	N/A	0 horas
	BLEDO (<i>Amaranthus Dubius</i>)			
	MALVA (<i>Malachra Alceifolia</i>)			
	PATA DE GALLINA (<i>Eleusine Indica</i>)			
	RABO DE ZORRO (<i>Setaria Genniculata</i>)			
	GUARDAROCÍO (<i>Digitaria Sanguinalis</i>)			
	PAJA AMERICANA (<i>Echinochloa Colonum</i>)			
	VERDOLAGA (<i>Portulaca Oleracea</i>)			
	YERBA DE SAPO (<i>Euphorbia Hirta</i>)			
	CORTADERA (<i>Cyperus Ferax</i>)			
	FALSA CAMINADORA (<i>Ischaenum Rugosum</i>)			
	BATATILLA (<i>Ipomoea Violacea</i>)			
DORMIDERA (<i>Mimosa Pudica</i>)				
*** MAIZ	EMILIA (<i>Emilia Sonchifolia</i>)	1.5 L/Ha Aplicación en postemergencia dirigida a las malezas entre calles del cultivo	N/A	0 horas
	SIEMPREVIVA (<i>Commelina Diffusa</i>)			
	CLAVITO (<i>Jussiaea Linifolia</i>)			
	PATA DE GALLINA (<i>Eleusine Indica</i>)			
	LIENDRE PUERCO (<i>Echinochloa Colonun</i>)			
	PAJAMONA (<i>Leptochloa Filiformis</i>)			
	TAMARINDILLO (<i>Phyllanthus Niruri</i>)			
	PALO DE AGUA (<i>Ludwinia Spp</i>)			
	COQUITO (<i>Cyperus Rotundus</i>)			
	BICHO (<i>Cassia Tora</i>)			
	BLEDO (<i>Amaranthus Sp</i>)			
	DORMIDERA (<i>Mimosa Púdica</i>)			
	GUALOLA (<i>Polygonum Hydropiperoides</i>)			
	PEGA PEGA (<i>Desmodium Tortuosum</i>)			
	BATATILLA (<i>Ipomoea Congesta</i>)			
	ORTIGA (<i>Urtica Urens</i>)			
	VERDOLAGA (<i>Portulaca Oleracea</i>)			
	PATA DE GALLINA (<i>Digitaria Sanguinalis</i>)			
CAMINADORA (<i>Rottboellia Exaltata</i>)				
PASTO JOHNSON (<i>Sorghun Halapense</i>)				
CAFE	SUELDA CON SUELDA (<i>Commelina difusa</i>)	1.5 L/Ha	N/A	0 Horas
	EMILIA (<i>Emilia sonchifolia</i>)			
	ORTIGA (<i>Urtica urens</i>)			



	BATATILLA <i>(Ipomoea congesta)</i>			
	CORTADERA <i>(Cyperus ferax)</i>			
	BOLSA DE PASTOR <i>(Capsella bursa pastoris)</i>			
	PAJA MONA <i>(Leptochloa filiformis)</i>			
	PASTO GUINEA <i>(Panicum máximum)</i>			
	GOLONDRINA <i>(Boerhaavia erecta)</i>			
	HELECHO <i>(Pteridium aquilinum)</i>			
	RABANO <i>(Raphanus sativus)</i>			
	ARTEMISA <i>(Artemisa vulgaris)</i>			
AGUACATE	LECHOSA <i>(Euphorbia hirta)</i>	Hacer una aplicación a dosis de 1.25 L/ha cuando las malezas de un máximo de 3 hojas verdaderas.	N/A	0 Horas
	FALSO TREBOL <i>(Oxalis sp)</i>			
	CAPERONIA <i>(Caperonia palustris)</i>			
	BORLITAS <i>(Emilia sonchifolia)</i>			
	CADILLO <i>(Bidens pilosa)</i>	Hacer una aplicación a dosis de 1.50 L/ha cuando las malezas tengan una altura máxima de 6 cm		
	DYMARIA <i>(Drymaria cordata)</i>			
	PASTO YARAGUA <i>(Melinis multiflora)</i>			
	BLEDO <i>(Amaranthus SP)</i>			
	PATA DE GALLINA <i>(Eleusine indica)</i>			
	VENADILLO <i>(Conyza bonariensis)</i>			

MOMENTO DE APLICACIÓN

- * **ARROZ:** Aplíquese en Pre-siembra al cultivo con malezas entre 10 y 15 cm.
- ****PLÁTANO Y BANANO:** Aplíquese en post-emergencia dirigida a las malezas entre calles del cultivo con malezas entre 10 y 15 cm.
- *****MAÍZ:** Aplíquese en post-emergencia dirigida a las malezas entre calles del cultivo con malezas entre 10 y 15 cm.
- CAFE:** Aplicar en las calles del cultivo con las malezas en crecimiento activo.

COMPATIBILIDAD

ZULU SL, no se debe mezclar sin antes realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación. Si se utiliza este producto a las dosis y cultivos recomendados en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

