



RELEVO® 350 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.

Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 15 24

www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Imidacloprid (E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine (IUPAC)350 g/L

Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 061

INSTRUCCIONES DE USO

RELEVO® 350 SC, es un insecticida sistémico, de prolongado efecto residual, que actúa por contacto e ingestión contra áfidos.

RELEVO® 350 SC, se absorbe por las hojas y las raíces, trastocándose por toda la planta. En los insectos, actúa afectándoles el sistema nervioso.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS cc/Ha	PC	PR
ROSA	Áfidos, Pulgones (<i>Macrosiphum rosae</i>)	250 – 300	1 Día	N/A
MAIZ	Chicharrita (<i>Dalbulus maidis</i>)	100	21 Días	12 Horas
TOMATE	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporarium</i>)	500	3 Días	
ARROZ	Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>)	100	21 Días	

MOMENTO DE APLICACIÓN

Antes de aplicar el producto revise los niveles de la plaga teniendo en cuenta el programa de monitoreo de la misma.

Aplice la mayor dosis cuando el nivel de infestación de las plagas sea alto y para un periodo de acción más prolongado.

COMPATIBILIDAD

RELEVO® 350 SC, es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes en el mercado. No es fitotóxico si se siguen las recomendaciones de dosis y uso dadas en la etiqueta..

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
CONSERVE EN UN LUGAR CERRADO
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II. MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

(Franja de color amarillo)