



# INICOL 70 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.  
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524  
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

### INGREDIENTE ACTIVO

PROPINEB *polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)* .....700 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kilo

## REGISTRO NACIONAL ICA No. 2567

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

## INSTRUCCIONES DE USO

INICOL 70 WP es un fungicida perteneciente al grupo de los carbamatos. Con acción preventiva, es un fungicida clasificado con acción multisitio según la FRAC(M3), con amplia acción residual. Actúa por contacto inhibiendo la germinación de los conidios y las esporas en el follaje.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C	P.R
ARROZ	<b>COMPLEJO MANCHADO DE GRANO</b> ( <i>Gaeumannomyces graminis</i> , <i>Fusarium sp</i> y <i>Curvularia sp.</i> )	2.0 – 2.5 Kg/ha	8 Días	4 Horas
PAPA	<b>GOTA</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2.5 Kg/ha		
TOMATE	<b>GOTA</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2.5 Kg/ha		
UCHUVA*				
LULO*				
TOMATE DE ARBOL*				
PIMENTON*				
CLAVEL	<b>Mancha anillada</b> ( <i>Cladosporium echinulatum</i> )	2,5 g/L de agua ó 2,5 kg/ha***	N.A.	

**PC:** Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
**PR:** Periodo de Reingreso: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

\* Cultivos menores según Resolución ICA 4754 del 07 de Diciembre de 2011

\*\* Dependiendo de las condiciones ambientales, aplicar la dosis más baja de manera preventiva cuando se presenten las condiciones propicias para el desarrollo del patógeno

\*\*\*Para un volumen de aplicación de 1.000 Litros de agua/Ha

## FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

INICOL® 70 WP, se aplica en máximo embuchamiento o en inicio de espiga, de manera preventiva. Se debe rotar con otros productos de diferentes mecanismos y modos de acción, para evitar la resistencia cruzada (a pesar de su acción multisitio). En Papa y Tomate, realizar la aplicación cuando se presenten las condiciones ambientales para el desarrollo de la enfermedad.

En Clavel se recomienda realizar una (1) sola aplicación de INICOL 70 WP de forma preventiva o cuando el cultivo presente un umbral de incidencia del 1 al 5 % y/o las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo de la enfermedad.

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

INICOL® 70 WP: se recomienda realizar pruebas de compatibilidad en pequeña escala cuando se requiera mezclar con otros productos plaguicidas.

## RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

