



# SPARTA 120 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.  
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524  
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) ) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

**Spinosad:** ..... **120 g/L**

Mezcla de Spinosyn A (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- $\alpha$ -L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetra-deoxy- $\beta$ -Derythropranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16bhexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]asindacene-7,15-dione y Spinosyn D (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- $\alpha$ -L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetra-deoxy- $\beta$ -Derythropranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16bhexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

**Aditivos** ..... **c.s.p. 1 Litro**

**REGISTRO NACIONAL ICA No. 2647**

## INSTRUCCIONES DE USO

**SPARTA 120 SC** es un insecticida que actúa sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Excitando el sistema nervioso por alteraciones en la función nicotínica y los canales iónicos del GABA. Después de la aplicación los insectos muestran temblores, parálisis irreversible, hasta ocasionar la muerte. Actúa sobre los moduladores alostéricos del receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR). Debido a que el ingrediente activo Spinosad actúa en sitios distintos a los neonicotinoides, fiproniles y abamectinas, no se espera resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos. No rotar con insecticidas con ingrediente activo Spinetoram.

Cultivo	Plaga a controlar	Dosis	PC	PR
Tomate	<b>Cogollero</b> ( <i>Tuta absoluta</i> )	300 ml/Ha	7 días	4 horas
<b>Ornamentales*</b> Rosa, pompón y Clavel**	<b>Trips</b> ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	100 ml/ha	N.A	4 horas

\* Cultivos ornamentales de acuerdo a la Resolución 1418 del 18 de febrero de 2016

\*\*Debido al alto número de especies ornamentales que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objetivo de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada.

## MOMENTO DE APLICACIÓN

**Tomate:** Realizar la aplicación cuando el nivel de infestación sea igual o superior a 30% de incidencia de plaga en los cogollos del cultivo.

**Ornamentales:** Cuando se observen daños en los primordios florales y también cuando se presente la presencia de por lo menos 0,5 individuos por planta por flor



# SPARTA 120 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA



## COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

## RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**  
(Franja de color azul)