



TRABUKO 50 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA



TRABUKO

50 EC

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. - Colombia Teléfonos: (57) 745 1524
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

BIFENTHRIN 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.

De formulación a 20 °C 50 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2785

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

INSTRUCCIONES DE USO

TRABUKO® 50 EC, es un insecticida que pertenece al grupo de los piretroides, actúa por contacto, ingestión sobre una amplia gama de insectos plaga de importancia agrícola.

TRABUKO® 50 EC afecta el sistema nervioso de los insectos, al afectar el equilibrio de iones sodio/potasio entre los nervios de la membrana celular causando parálisis del sistema nervioso y la muerte del insecto.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS (PC/ha) - USO	PC	PR
PASTOS	Chinche de los Pastos <i>Collaria scenica</i>	1.0 L/Ha	28 días	*4 Horas
PAPA	Pulguilla <i>Epitrix cucumeris</i>	1.0 L/Ha	7 días	4 Horas

***PASTOS**: No permitir la entrada de los animales al pastoreo hasta los 20 días después de la aplicación del producto.

P.C: Periodo de Carencia: Tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.

EPOCA DE APLICACION

Pastos: Se recomienda realizar una (1) sola aplicación en forma de caracol, es decir de afuera hacia dentro para encerrar la chinche, ya que esta plaga es de gran habilidad y se mueven con gran rapidez. Al igual que hacer las aplicaciones en días soleados, debido a que el hábito alimenticio del insecto plaga es comer en las horas más soleadas, estas pueden ser de 10 am a 3 pm de la tarde.

Papa: Se recomienda aplicar una (1) sola aplicación en la etapa inicial del cultivo, con umbrales de infestación de 1 insecto por cada pase doble de jama.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Llene el tanque de mezcla hasta la mitad, vierta la dosis exacta de **BESTIAL®** y agite bien la mezcla para obtener una solución homogénea y termine de llenar con agua.

Después de cada aplicación, los utensilios usados en la mezcla al igual que los equipos, deben lavarse en forma adecuada.

COMPATIBILIDAD

TRABUKO® 50 EC, no se debe mezclar sin antes realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**