LEGACY

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FECHA DE ACTUALIZACION: noviembre 2022

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 15 24 / 634 8391 - 634 8392
www.**agroserag**.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C.

REGISTRO NACIONAL ICA No. PL0003722022

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Fludioxonil ..... **250 g/Kg**
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

Ciprodinil ..... **375 g/Kg**
4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine

Aditivos ..... **c.s.p. 1 Kg**

GENERALIDADES

LEGACY es un fungicida sistémico, de rápida penetración, amplio espectro y efecto preventivo-curativo. Por su eficacia probada contra este patógeno en rosas y otros cultivos, constituye una alternativa importante para el manejo eficaz de esta enfermedad, como fungicida protectante y sistémico orientado a prevenir la incidencia del patógeno o para disminuir su dispersión cuando ya está presente en el cultivo.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C	P.R
ORNAMENTALES* ROSA, CLAVEL, POMPÓN.	**Podredumbre gris** *Botrytis cinerea*	0.5 g/L de agua	N.A.	4 horas
AGUACATE**	**Antracnosis** (Colletotrichum spp) **Moho gris** (Botrytis spp)	0.6 kg/ha	0 días	4 horas

** Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este producto plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar un aplicación generalizada.*
*** Ampliación de uso a través del mecanismo de historial de uso, establecido en las Resoluciones ICA 075486 del 15 de septiembre de 2020 y 114030 del 3 de diciembre de 2021.*

P.C: Período de carencia: Intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.
P.R: Período de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.
N.A.: No Aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICAICON

Realizar la aplicación al observar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan su desarrollo y de acuerdo a los resultados del monitoreo. Aplicar dentro de un programa de manejo integrado de la enfermedad, en rotación con fungicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de resistencia. No aplicar si hay probabilidad inminente de lluvias ya que el producto se podría lavar y contaminar fuentes de agua.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas a pequeña escala. No es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso descritas en la etiqueta. Se recomienda efectuar pruebas de fitotoxicidad con nuevas variedades o híbridos.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO