



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Famoxadone (RS)-3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione de formulación a 20 °C225 g/Kg
Cimoxanil 1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea, de formulación a 20°C. 300 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

REGISTRO NACIONAL ICA No. PL0001302022

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

INSTRUCCIONES DE USO

ALIADO WG, es un fungicida potenciado con base en 2 ingredientes activos de eficaz acción sobre hongos: Famoxadone que actúa por contacto únicamente, presentando una buena actividad residual e inhibiendo la respiración fúngica que conduce al cese de la energía que requiere funciones celulares y la muerte eventual de los hongos afectados y Cymoxanil que es un fungicida que posee actividad sistémica de contacto y local, inhibiendo múltiples procesos celulares tales como la síntesis de ADN y ARN, la síntesis de aminoácidos, la respiración micelial, la síntesis de proteínas, el metabolismo de la uridina y la permeabilidad de la membrana.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C	P.R.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.6 kg/ha		
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizon tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.5 kg/ha	14 días	4 horas
Tomate de Árbol*				
Lulo*				
Uchuva*				

P.C.: Periodo de Carencia, intervalo entre la última aplicación y cosecha (días).

P.R.: Periodo de reentrada: Horas transcurridas entre la última aplicación y la entrada al área tratada.

N.A.: No Aplica

* Cultivos menores según Resolución ICA 4754 del 07 de Diciembre de 2011

INSTRUCCIONES DE USO

Para la preparación de la mezcla es necesario llenar el tanque del equipo que se va a utilizar hasta la mitad con agua, poner el agitador en marcha y agregar la dosis requerida de **ALIADO WG**. Finalmente completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo el agitador en marcha para lograr una solución homogénea, estos deben mantenerse funcionando durante toda la aplicación.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Papa: Se recomienda realizar una (1) sola aplicación de ALIADO WG (Famoxadone 225 g/Kg + Cymoxanil 300 g/Kg- WG), a una dosis de 0,6 Kg /ha cuando se presenten los primeros síntomas o cuando se presenten las condiciones climáticas propicias para la proliferación de la enfermedad, con un volumen de aplicación de 200 a 400 L/Ha dependiendo de la fenología del cultivo. Si son necesarias más aplicaciones, rotar con productos de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia según la FRAC.

Tomate: Se recomienda realizar una (1) sola aplicación de ALIADO WG (Famoxadone 225 g/Kg + Cymoxanil 300 g/Kg- WG), a una dosis de 0.5 Kg /ha, cuando se presenten los primeros síntomas o cuando se presenten las condiciones climáticas propicias para la proliferación de la enfermedad, con un volumen de aplicación de 400 L/Ha. Si son necesarias más aplicaciones, rotar con productos de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia según la FRAC.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

El producto no debe mezclarse con otros productos de naturaleza alcalina.

Si se aplica según las recomendaciones de esta etiqueta no es esperable efectos fitotóxicos.

RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

